

노로바이러스 발생 우려 시 소독청소방법

손이 닿는 모든 부분은 하루 3번 이상 소독액을 이용하여 닦아야 합니다.

1) 페트병을 이용하여 간단하게 소독액을 만듭니다.

준비물

- 염소계 표백제
- 500ml 페트병(잘 씻고 건조한 병), 종이컵(180ml)
- 종이타월
- 쓰레기봉투(버리기 쉽도록 쓰레기통에 씌워놓기)
- 일회용 고무장갑
- 마스크 및 앞치마 등(감염방지용)



2) 소독액을 만듭니다(국내시판 차아염소산나트륨 제품기준).

① 0.1%(1000ppm)농도의 소독액을 만듭니다.

0.1%(종이컵 1/5컵분량)염소계 표백제를 페트병에 붓습니다.

표백제가 든 페트병에 물을 가득 채운 후 뚜껑을 닫고 잘 흔들어 섞습니다.



② 소독액을 종이타월 등으로 묻혀 닦고 10분 후에 깨끗한 물걸레로 닦아냅니다..



변기



수도꼭지



침대난간 등



전화기



문고리, 창틀 등




컴퓨터, 마우스

그림출처 : www.cloroprofessional.com


③ 창문을 열어서 환기를 시키고 올바른 손씻기를 합니다.




1 손바닥과 손바닥을 마주대고 문질러 주세요



2 손등과 손바닥을 마주대고 문질러 주세요



3 손바닥을 마주대고 손가락을 끼고 문질러 주세요



4 손가락을 마주잡고 문질러 주세요



5 엄지손가락을 다른 편 손바닥으로 돌려주며 문질러 주세요



6 손가락을 반대편 손바닥에 놓고 문지르며 손톱 밑을 깨끗하게 하세요

노로바이러스 발생 시 소독방법

① 0.5%(5000ppm)농도의 소독액을 만듭니다.

0.5%(종이컵1/3컵 분량) 염소계 표백제를 페트병에 붓습니다.

물을 더해 500ml로 채운 후 뚜껑을 닫아 잘 흔들어 섞습니다.



② 구토물이나 분변을 치워 비닐봉지에 담습니다.

소독액으로 적신 종이타월로 구토물 등을 닦습니다.

닦아낸 면을 덮어가면서 담아 제거한 후 쓰레기봉투에 담습니다.



③ 구토물 등이 있던 곳과 주변을 소독합니다.

소독약을 적신 종이타월로 수 차례 닦은 후 물로도 수 차례 닦는다.

사용한 종이타월과 장갑도 쓰레기봉투에 담아 소독액을 뿌린 후 밀폐시켜 버린다.



3) 처리 후에는 비누를 이용하여 30초 이상 올바른 손씻기를 합니다.

❖ 발생장소 별 세부 소독방법

소독할 장소 또는 물건	부위·종류 등	소독방법
화장실, 세면대, 욕실	대소변기, 배수용 레버, 손잡이, 수도꼭지, 욕조	세제 등으로 더러워진 곳을 닦은 후 묽은 소독액을 뿌린 후 10분 후에 물로 씻어낸다.
구토물 또는 분변이 튄 장소, 더러워진 손으로 만든 장소 등	마루, 벽, 문손잡이, 전화기 등	묽은 소독액을 종이타월 등으로 묻혀 닦고 10분 후에 물(깨끗한 물걸레)로 닦아낸다.
구토물 또는 분변으로 더러워진 곳(잠옷, 속옷, 시트 등)	잠옷, 속옷, 시트, 천 기저귀 등	더러워진 곳을 닦아 묽은 소독액에 30분 정도 담근 후 세탁한다. 젖은 수건을 대고 스팀 다리미로 85도, 1분 이상 가열하는 것도 효과 있음.
구토물 또는 분변과 접촉한 물건	마스크, 앞치마, 종이타월	쓰레기봉투에 넣어 버린다.